

گزارش کک لور (*Altica viridula* (Weise, 1889) در منطقه کردکوی
(استان گلستان)

محمدرضا کاوسی

اعضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. Kavosi_66@yahoo.com

طی نمونه برداری‌هایی که در تابستان ۱۳۸۶ به منظور شناسایی مهمترین آفات و بیماری‌ها در جنگل‌ها و نهالستان‌های شمال کشور انجام گرفت، در ارتفاعات بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا و دامنه جنوبی البرز در منطقه درازنو، حوزه شهرستان کردکوی، لارو و سوسک‌هایی روی درختان و نهالهای لور (Mill.1759 *Carpinus orientalis*) و کچف (*Carpinus schuschansis* H. Winkl.1904) در سطح وسیعی از منطقه (بیش از ۲۰۰ هکتار) مشاهده و جمع‌آوری گردید. پس از بررسی لاروها در سنین مختلف و حشره کامل، آفت کک لور (*Altica viridula* Weise, 1889) تشخیص داده شد.

تاریخ و محل جمع‌آوری: ۲۲ / ۵ / ۱۳۸۶، کردکوی.

بر اساس بررسی به عمل آمده در قالب مطالعات مقدماتی طرح ملی کنترل بیولوژیکی و میکروبیولوژیکی آفات و بیماریهای درختان جنگلی (پروژه مشترک ایران و روسیه) آفت فوق برای اولین بار در منطقه فوق گزارش می‌شود. در این بررسی مشاهده شد که آفت فوق در اکثر ارتفاعات فوقانی جنگل‌های شمال کشور وجود دارد ولی در منطقه درازنو استان گلستان و ماسوله استان گیلان بیشتر از سایر مناطق به درختان و نهال‌های کچف ولور خسارت شدید وارد نموده است.